

# Programme de colle




## Questions de cours et exercices

### Éléments et molécules

1. Établir un schéma de Lewis pertinent pour une molécule ou un ion à partir de la méthode de l'octet imposé. Savoir vérifier la règle de l'octet et identifier les écarts à celle-ci.
2. Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique donnée d'une molécule.
3. **Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.**

### Évolution temporelle d'un système chimique

4. Savoir exprimer les coefficients stoechiométriques algébriques d'une réaction donnée.
5. Connaître la notion d'avancement de la réaction et savoir le relier (par définition) à l'avancement volumique et à la vitesse volumique de réaction.
6. Connaître la définition de la vitesse d'apparition et de disparition d'une espèce présente dans un bilan de réaction et savoir la relier à la vitesse volumique de réaction.
7. Connaître l'expression de la vitesse volumique d'une réaction admettant un ordre courant en fonction des concentrations et du facteur cinétique. Exprimer les ordres partiels dans le cas d'une réaction d'ordre simple (ou loi de Van't Hoff).
8. Savoir retrouver l'expression de la concentration d'un réactif en fonction du temps dont la réaction suit une loi d'ordre simple 0, 1 ou 2.
9. **Savoir retrouver l'expression des temps de demi-réaction en fonction de l'ordre 0, 1 ou 2.**



Programme officiel :	Notions et contenus	Capacités exigibles
<b>Structure des entités chimiques</b>		
<b>Modèle de la liaison covalente</b>	Liaison covalente localisée. Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion monoatomique ou d'un ion polyatomique pour les éléments des blocs s et p.	Citer les ordres de grandeur de longueurs et d'énergies de liaisons covalentes. Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique. Établir un schéma de Lewis pertinent pour une molécule ou un ion. Identifier les écarts à la règle de l'octet.
<b>Géométrie et polarité des entités chimiques</b>	Électronégativité : liaison polarisée, moment dipolaire, molécule polaire.	Associer qualitativement la géométrie d'une entité à une minimisation de son énergie. Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau périodique. Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu. Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique donnée d'une molécule. Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule de géométrie donnée.
<b>Relations structure des entités - propriétés physiques macroscopiques</b>		
<b>Interaction entre entités</b>	Interactions de van der Waals. Liaison hydrogène ou interaction par pont hydrogène.	Citer les ordres de grandeur énergétiques des interactions de van der Waals et de liaisons hydrogène. Interpréter l'évolution de températures de changement d'état de corps purs moléculaires à l'aide de l'existence d'interactions de van der Waals ou par pont hydrogène.
<b>Solubilité ; miscibilité.</b>	Grandeurs caractéristiques et propriétés de solvants moléculaires : moment dipolaire, permittivité relative, caractère protogène. Mise en solution d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.	Associer une propriété d'un solvant moléculaire à une ou des grandeurs caractéristiques. Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants. Interpréter la solubilité d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.
<b>Structure et propriétés physiques des solides</b>		
<b>Métaux</b>	Cohésion et propriétés physiques des métaux.	Positionner dans le tableau périodique et reconnaître les métaux et non métaux.
<b>Réactions d'oxydo-réduction</b>		
<b>Oxydants et réducteurs, réactions d'oxydo-réduction</b>	Nombre d'oxydation. Exemples d'oxydants et de réducteurs minéraux usuels : nom, nature et formule des ions thiosulfate, permanganate, hypochlorite, du peroxyde d'hydrogène.	Relier la position d'un élément dans le tableau périodique et le caractère oxydant ou réducteur du corps simple correspondant. Prévoir les nombres d'oxydation extrêmes d'un élément à partir de sa position dans le tableau périodique. Identifier l'oxydant et le réducteur d'un couple.
<b>Évolution temporelle d'un système chimique</b>		
<b>Cinétique en réacteur fermé de composition uniforme</b>	Lois de vitesse : réactions sans ordre, réactions avec ordre simple (0, 1, 2), ordre global, ordre apparent. Temps de demi-vie d'un réactif, temps de demi-réaction.	Vitesses de consommation d'un réactif et de formation d'un produit. Vitesse de réaction pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique supposée sans accumulation d'intermédiaires. Relier la vitesse de réaction, dans les cas où elle est définie, à la vitesse de consommation d'un réactif ou de formation d'un produit. Exprimer la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la valeur de la constante cinétique à une température donnée. Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numérique ou graphique. Déterminer un ordre de réaction à l'aide de la méthode différentielle ou à l'aide des temps de demi-réaction. Confirmer la valeur d'un ordre par la méthode intégrale, en se limitant strictement à une décomposition d'ordre 0, 1 ou 2 d'un unique réactif, ou se ramenant à un tel cas par dégénérescence de l'ordre ou conditions initiales stœchiométriques. Déterminer la valeur de l'énergie d'activation d'une réaction chimique à partir de valeurs de la constante cinétique à différentes températures.
Loi d'Arrhenius ; énergie d'activation.		